

# Avertissements agricoles



Bulletin n° 20 du 2 août 1988

Numérotation continue : n° 73

**COLZA :**

- . Mouche du chou.
- . Désherbage.

**MAIS :**

- . Pucerons.

**COLZA :**

Depuis quelques années, les ravageurs d'automne traditionnels (altise, charançon du bourgeon terminal) sont restés discrets. De nombreux traitements ont pu être ainsi évités.

**Mouche du chou :**

La mouche du chou est plus fréquemment rencontrée, mais n'occasionne, le plus souvent, que des dégâts restreints.

**Lutte :**

- . Eviter les semis trop précoces, toujours les plus gravement atteints.
- . Si nécessaire, utiliser un microgranulé de préférence localisé dans la raie de semis, en sachant toutefois que son efficacité dépendra essentiellement de l'humidité du sol après le semis.

Spécialités	Dose en g aux 100 m linéaires
CURATER	30 à 40
COUNTER PLUS	33 à 40
DELEX	30 à 40
DELTANET	40
ONCOL SG	30 à 40

Des essais de microgranulés mélangés à la semence montrent qu'il est possible de réaliser une telle application à condition toutefois :

- . d'utiliser un microgranulé de densité comparable à la semence (ONCOL, COUNTER)
- . de ne préparer le mélange que pour 2-3 ha à la fois.

L'efficacité sur la mouche est bonne lorsque les attaques sont faibles, mais n'est pas vérifiée dans le cas d'attaque moyenne à forte.

**Traitements de post-levée :** Les résultats d'essais, des automnes précédents, sont peu concluants et trop irréguliers pour conseiller cette technique.

Imprimerie de la Station de NANCY

Directeur-Gérant : D. VERBEKE

Publication Périodique

CPPAP No : 2011 AD

Abonnement annuel 185 F

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

SERVICE REGIONAL DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

38-40, rue Sainte-Catherine

54000 NANCY  
Tél. 83.30.41.51

P 117

### Désherbage du semis à la levée :

Pas de nouveautés par rapport aux précédentes campagnes (voir tableau page 3).

Dans le cas de fortes infestations de capselles, préférer un programme à base de BUTISAN.

#### 1 . TREFLAN (2 l) ou DEVRINOL (2,2 l) pré-semis, puis BUTISAN S (1,5 l) post-semis :

Actifs sur de nombreuses dicotylédones et graminées, sauf repousses de céréales, à conseiller pour flore à dominante dicotylédones.

Le programme DEVRINOL - BUTISAN est le plus complet sur géranium et matricaire.

#### 2. COMODOR (3 l) pré-semis, puis BUTISAN S (1,5 l) post-semis :

Bon sur dicotylédones et graminées y compris repousses de céréales. A conseiller pour infestation moyenne en graminées.

#### 3. BUTISAN S (1,5 l) post-semis, puis BUTISAN S (1,5 l) post-levée, 1ère feuille pointante :

Plus sélectif que BUTISAN S à 2,5 l en un passage, à privilégier dans le cas de fortes infestations de capselle.

En cas de sol trop léger et filtrant, préférer un des deux programmes précédents.

### Attention aux repousses :

Dès 1989, il sera exigé, pour un meilleur prix, des colzas pauvres en glucosinolates (variétés "00"). Or, il suffit de 15 à 20 % de repousses de variétés simple "0" dans une parcelle double "00" pour dépasser les 35 micromoles exigées.

Il est donc très important d'éliminer, dès à présent, le maximum de repousses de colza "0" en laissant lever le maximum de graines avant l'implantation de la nouvelle culture.

### MAIS :

#### Pucerons :

Quelques pucerons (*Rhopalosiphum padi*) sont observés notamment dans des parcelles traitées contre la pyrale avec des pyrèthrinoïdes liquides.

Les populations sont généralement trop faibles pour exiger une intervention. Cependant, continuer à observer les parcelles les plus exposées durant 15 jours après la floraison femelle et intervenir éventuellement en cas de fort développement avec du pyrimicarbe (PIRIMOR G) à raison de 350 g/ha.

\*\*\*\*\*





Désherbage semis de colza à la levée

	Matière active	Spécialité commerciale	Dose/Ha de spécialité	O B S E R V A T I O N S
PRE - SEMIS	diallate	AVADEX	3,5 à 4 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation immédiate après application</li> <li>. Actif uniquement sur graminées</li> <li>. Dose de 4 L si folle-avoine et repousses céréales</li> </ul>
	trifluraline	nombreuses spécialités dont TREFLAN	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation immédiate après épandage</li> <li>. Actif sur graminées, sauf repousses de céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones</li> </ul>
	napropamide	DEVRIOL FL	2,2 à 2,8 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation superficielle dans les 2 jours (sauf si pluies importantes)</li> <li>. Actif sur graminées : sauf folle-avoine et repousses céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont GILLETTS, MATRICAIRES</li> <li>. La dose de 2,8 L est une dose maximum à n'utiliser qu'en sol argileux (+ 25 % argile) (risque phytotoxicité sur la culture suivante)</li> </ul>
	nitralin + napropamide	ZULAN FULTON	2,5 Kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Incorporation superficielle dans les 2 jours</li> <li>. Actif sur graminées : (proche de napropamide)</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES</li> </ul>
PRE-SEMS ou PRE-LEVÉE	tébutame	COMODOR	4 à 5 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. En pré-semis, incorporation uniquement si sol pierreux</li> <li>. Actif sur graminées : 5 L en pré-semis si risque repousses de céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones</li> </ul>
PRE - LEVÉE	dimétachlore	TERIDOX	2 à 3 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Risque de phytotoxicité (surtout en terres légères) utiliser 2 L</li> <li>. Actif sur graminées : sauf folle-avoine, repousses céréales</li> <li>. Actif sur dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES</li> </ul>
	métazachlore	BUTISAN S	2,5 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. A n'utiliser qu'en conditions de semis favorables (préparation de sol, date et profondeur de semis). Même dans ces conditions la sélectivité peut être insuffisante.</li> <li>. Utilisation préférable immédiatement après le semis : possible jusqu'à 3 jours après</li> <li>. Très bonne efficacité herbicide</li> <li>. Actif sur graminées sauf repousses céréales et folle-avoine</li> <li>. Actif sur nombreuses dicotylédones : dont MATRICAIRES, CAPSELLES</li> </ul>
POST-LEVÉE PRECOCE	métazachlore	BUTISAN S	3 L	<ul style="list-style-type: none"> <li>. A utiliser dès le stade "cotylédons étalés-1ère feuille pointante du colza"</li> <li>. La firme préconise ce type d'application pour les semis en conditions difficiles</li> <li>. Ce type d'utilisation est efficace sur : CAPSELLES</li> </ul>